

| Taxons protégés | | | Risque encouru et cerfa associé | | | | |
|----------------------------------|------------------------|--------------------|--|-----------------------|--------------|---------|-------------|
| | | | 13614*01 | 13617*01 | 13616*01 | | |
| Nom scientifique | Nom vernaculaire | Population estimée | Dégradation temporaire à destruction permanente d'habitats | Cueillette/enlèvement | Perturbation | Capture | Destruction |
| <i>Alytes obstetricans</i> | Alyte accoucheur | 6 | X | | X | X | X |
| <i>Bufo spinosus</i> | Crapaud épineux | 1 | X | | X | X | X |
| <i>Hyla meridionalis</i> | Rainette méridionale | 1 | X | | X | X | X |
| <i>Pelophylax kl. esculentus</i> | Grenouille verte | ? | X | | X | X | X |
| <i>Salamandra salamandra</i> | Salamandre tachetée | 1 | X | | X | X | X |
| <i>Erinaceus europaeus</i> | Hérisson d'Europe | ?, traces | X | | X | | X |
| <i>Lacerta bilineata</i> | Lézard à deux raies | 2 contacts | X | | X | | X |
| <i>Podarcis muralis</i> | Lézard des murailles | 50aine de contacts | X | | X | | X |
| <i>Aegithalos caudatus</i> | Mésange à longue queue | 30 | X | | X | | |
| <i>Anas platyrhynchos</i> | Canard colvert | 3 | X | | X | | |
| <i>Anthus pratensis</i> | Pipit farlouse | 7 | X | | X | | |
| <i>Anthus trivialis</i> | Pipit des arbres | 5 | X | | X | | |
| <i>Ardea cinerea</i> | Héron cendré | 1 | X | | X | | |
| <i>Barbastella barbastellus</i> | Barbastelle d'Europe | 15 contacts | X | | X | | |
| <i>Buteo buteo</i> | Buse variable | 1 | X | | X | | |
| <i>capreolus capreolus</i> | Chevreuil européen | - | X | | X | | |
| <i>Caprimulgus europaeus</i> | Engoulevent d'Europe | 2 | X | | X | | |
| <i>Carduelis carduelis</i> | Chardonneret élégant | >10 | X | | X | | |
| <i>Certhia brachydactyla</i> | Grimpereau des jardins | 5 | X | | X | | |
| <i>Cettia cetti</i> | Bouscarle de Cetti | 13 | X | | X | | |
| <i>Chloris chloris</i> | Verdier d'Europe | 6 | X | | X | | |
| <i>Circaetus gallicus</i> | Circaète Jean-le-Blanc | 1 | X | | X | | |
| <i>Cisticola juncidis</i> | Cisticole des joncs | 3 | X | | X | | |
| <i>Coenagrion mercuriale</i> | Agrion de Mercure | 7 | X | | X | | |
| <i>Coenonympha oedippus</i> | Fadet des Laïches | 3 | X | | X | | |
| <i>Columba palumbus</i> | Pigeon ramier | >50 | X | | X | | |
| <i>Corvus corone</i> | Corneille noire | >10 | X | | X | | |
| <i>Cyanistes caeruleus</i> | Mésange bleue | 15 | X | | X | | |
| <i>Dendrocopos major</i> | Pic épeiche | 3 | X | | X | | |
| <i>Elanus caeruleus</i> | Elanion blanc | 1 couple | X | | X | | |
| <i>Emberiza cirrus</i> | Bruant zizi | 6 | X | | X | | |
| <i>Emberiza citrinella</i> | Bruant jaune | 5 | X | | X | | |
| <i>Eptesicus serotinus</i> | Sérotine commune | > 100 contacts | X | | X | | |
| <i>Erithacus rubecula</i> | Rougegorge familier | >30 | X | | X | | |
| <i>Falco tinnunculus</i> | Faucon crécerelle | 2 | X | | X | | |
| <i>Fringilla coelebs</i> | Pinson des arbres | >60 | X | | X | | |
| <i>Garrulus glandarius</i> | Geai des chênes | 3 | X | | X | | |
| <i>Genetta genetta</i> | Genette commune | 1 | X | | X | | |
| <i>Hippolais polyglotta</i> | Hypolaïs polyglotte | >10 | X | | X | | |
| <i>Hirundo rustica</i> | Hirondelle rustique | 4 | X | | X | | |

| Taxons protégés | | | Risque encouru et cerfa associé | | | | |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|-----------------------|--------------|---------|-------------|
| | | | 13614*01 | 13617*01 | 13616*01 | | |
| Nom scientifique | Nom vernaculaire | Population estimée | Dégradation temporaire à destruction permanente d'habitats | Cueillette/enlèvement | Perturbation | Capture | Destruction |
| <i>Lanius collurio</i> | Pie-grièche écorcheur | 1 couple | X | | X | | |
| <i>Locustella naevia</i> | Locustelle tachetée | 2 | X | | X | | |
| <i>Lophophanes cristatus</i> | Mésange huppée | 4 | X | | X | | |
| <i>lucanus cervus</i> | Lucane cerf-volant | 1 | X | | X | | |
| <i>Lullula arborea</i> | Alouette lulu | 2 | X | | X | | |
| <i>Luscinia megarhynchos</i> | Rossignol philomèle | 10 | X | | X | | |
| <i>Lutra lutra</i> | Loutre d'Europe | 1 | X | | X | | |
| <i>Martes foina</i> | Fouine | 1 | X | | X | | |
| <i>Milvus milvus</i> | Milan royal | 1 | X | | X | | |
| <i>Miniopterus schreibersii</i> | Minioptère de Schreibers | 14 contacts | X | | X | | |
| <i>Motacilla alba</i> | Bergeronnette grise | 3 | X | | X | | |
| <i>Muscicapa striata</i> | Gobemouche gris | 4 | X | | X | | |
| <i>Mustela lutreola</i> | Vison d'Europe | - | X | | X | | |
| <i>Mustela nivalis</i> | Belette d'Europe | 15 | X | | X | | |
| <i>Mustela putorius</i> | Putois d'Europe | - | X | | X | | |
| <i>Myotis daubentonii</i> | Murin de Daubenton | > 800 contacts | X | | X | | |
| <i>Myotis emarginatus</i> | Murin à oreilles échancrées | 13 contacts | X | | X | | |
| <i>Myotis nattereri</i> | Murin de Natterer | ~100 contacts | X | | X | | |
| <i>Nyctalus leisleri</i> | Noctule de Leisler | 13 contacts | X | | X | | |
| <i>Nyctalus noctula</i> | Noctule commune | 3 contacts | X | | X | | |
| <i>Parus major</i> | Mésange charbonnière | 50 | X | | X | | |
| <i>Passer domesticus</i> | Moineau domestique | >40 | X | | X | | |
| <i>Phoenicurus ochruros</i> | Rougequeue noir | 4 | X | | X | | |
| <i>Phylloscopus collybita</i> | Pouillot véloce | >10 | X | | X | | |
| <i>Pica pica</i> | Pie bavarde | 5 | X | | X | | |
| <i>Picus viridis</i> | Pic vert | 10 | X | | X | | |
| <i>Pipistrellus kuhlii</i> | Pipistrelle de Kuhl | > 2000 contacts | X | | X | | |
| <i>Pipistrellus pipistrellus</i> | Pipistrelle commune | > 3000 contacts | X | | X | | |
| <i>Pipistrellus pygmaeus</i> | Pipistrelle pygmée | 1 contact | X | 1 contact | X | | |
| <i>Plecotus sp.</i> | Oreillard sp. | 13 contacts | X | | X | | |
| <i>Prunella modularis</i> | Accenteur mouchet | 4 | X | | X | | |
| <i>Regulus ignicapilla</i> | Roitelet à triple bandeau | 10 | X | | X | | |
| <i>Rhinolophus ferrumequinum</i> | Grand rhinolophe | 2 contacts | X | | X | | |
| <i>Saxicola rubicola</i> | Tarier pâtre | >15 | X | | X | | |
| <i>Sciurus vulgaris</i> | Ecureuil roux | ?, traces | X | | X | | |
| <i>Sitta europaea</i> | Sittelle torchepot | 10 | X | | X | | |
| <i>Streptopelia decaocto</i> | Tourterelle turque | 2 | X | | X | | |
| <i>Streptopelia turtur</i> | Tourterelle des bois | 2 | X | | X | | |
| <i>Sturnus vulgaris</i> | Etourneau sansonnet | >20 | X | | X | | |
| <i>Sylvia atricapilla</i> | Fauvette à tête noire | 20 | X | | X | | |

| Taxons protégés | | | Risque encouru et cerfa associé | | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--|-----------------------|--------------|---------|-------------|
| | | | 13614*01 | 13617*01 | 13616*01 | | |
| Nom scientifique | Nom vernaculaire | Population estimée | Dégradation temporaire à destruction permanente d'habitats | Cueillette/enlèvement | Perturbation | Capture | Destruction |
| <i>Sylvia undata</i> | Fauvette pitchou | 8 couples | X | | X | | |
| <i>talpa europea</i> | Taupe d'Europe | - | X | | X | | |
| <i>Troglodytes troglodytes</i> | Troglodyte mignon | >20 | X | | X | | |
| <i>Turdus merula</i> | Merle noir | >25 | X | | X | | |
| <i>Turdus philomelos</i> | Grive musicienne | 5 | X | | X | | |
| <i>Drosera intermedia</i> | Rosolis à feuilles intermédiaires | 112 | X | X | | | |
| <i>Drosera rotundifolia</i> | Rosolis à feuilles rondes | 545 | X | X | | | |
| <i>Lotus hispidus</i> | Lotier hispide | 770 | X | X | | | |