



Légende des chiroptères et leurs habitats

DREAL Poitou-Charentes



Direction régionale
de l'Environnement,
de l'Aménagement
et du Logement
POITOU-CHARENTES


Mise à 2x2 voies de la RN141 entre La Vigerie et Villesèche - Etat initial faune flore

-  Aire d'étude immédiate
-  Aire d'étude rapprochée
-  Aire d'étude éloignée
-  Enregistreurs automatiques des ultrasons (SM2BAT)

Habitats des espèces

-  Milieux anthropiques de type habitations et jardins, utilisés respectivement comme gîtes bâtis potentiels et territoires de chasse pour la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl et l'Oreillard gris
-  Milieux forestiers de types chênaies, utilisés comme territoires de chasse et/ou secteurs de gîtes arboricoles potentiels pour la Barbastelle d'Europe, le Murin de Bechstein, la Noctule de Leisler, la Noctule commune, le Murin à oreilles échanquées, le Murin de Natterer, le Petit Rhinolophe, le Murin de Daubenton et potentiellement pour le Murin d'Alcathoe, le Grand Murin/Petit Murin, la Pipistrelle de Nathusius et l'Oreillard roux
-  Milieux humides de type saulaies et aulnaies, utilisés comme territoires de chasse par la majorité des espèces et principalement par le Murin de Daubenton
-  Milieux semi-ouverts à ouverts de type friches, fourrés et ronciers, utilisés uniquement comme territoires de chasse pour le Grand Rhinolophe, le Minioptère de Schreibers et la Sérotine commune
-  Milieux ouverts de type prairies, utilisés uniquement comme territoires de chasse pour le Grand Rhinolophe, le Minioptère de Schreibers et la Sérotine commune
-  Vergers utilisés potentiellement comme territoires de chasse par les Rhinolophes
-  Corridors de type haies, utilisés pour le déplacement et la chasse de l'ensemble des espèces
-  Corridors de type haies, utilisés pour le déplacement et la chasse de l'ensemble des espèces
-  Gîte arboricole potentiel
-  Gîte bâti potentiel (maison abandonnée)
-  Pont favorable à l'installation des chauves-souris / Aucun individu observé
-  Pont non favorable à l'installation de chauves-souris / Aucun individu observé

NB : Bien que les espèces soient rattachées à un cortège en particulier du fait de leurs affinités écologiques, certaines d'entre elles peuvent néanmoins fréquenter d'autres types de milieux au cours de leur cycle de vie. La Barbastelle d'Europe par exemple, peut chasser au sein des milieux ouverts. Elle utilise aussi le milieu bâti pour le gîte, comme le Murin à oreilles échanquées. Aussi, le Minioptère de Schreibers chasse régulièrement au niveau des milieux anthropiques (dans les jardins, sous les lampadaires).





Carte 1

Barbastelle d'Europe
Sérotine commune
Murin de Daubenton
Murin d'Alcathoe/Murin à oreilles échancrées
Murin de Natterer
Pipistrelle commune
Pipistrelle de Kuhl/Pipistrelle de Nathusius
Grand Rhinolophe
Sérotines sp./Noctules sp.
Pipistrelles sp./Mioptère de Schreibers
Murins sp.
Oreillards sp.

Barbastelle d'Europe
Murin à oreilles échancrées
Murin d'Alcathoe/Murin à oreilles échancrées
Murin de Bechstein
Murin de Natterer
Pipistrelle commune
Noctule de Leisler
Noctule commune
Mioptère de Schreibers
Pipistrelle de Kuhl
Pipistrelle de Kuhl/Pipistrelle de Nathusius
Grand Rhinolophe
Sérotines sp./Noctules sp.
Murins sp.
Oreillards sp.

Barbastelle d'Europe
Sérotine commune
Murin à oreilles échancrées
Pipistrelle commune
Noctule commune
Mioptère de Schreibers
Pipistrelle de Kuhl
Pipistrelle de Kuhl/Pipistrelle de Nathusius
Pipistrelles sp./Mioptère de Schreibers
Grand Rhinolophe
Sérotines sp./Noctules sp.
Murins sp.



Carte 2

